

MERCURE

HOTEL

ANTALYA - KONYAALTI



BİYOÇEŞİTLİLİK
Bitki Çeşitliliği

ZAKKUM

Nerium oleander



Dünyada ılıman ve subtropikal bölgelerde süs ve peyzaj bitkisi olarak yetiştirilen çalı veya küçük ağaçtır. Halen Nerium cinsinde sınıflandırılan yalnızca türler, dogbane familyasının Apocynaceae alt familyasına Apocynoideaeye aittir. O kadar yaygın bir şekilde yetiştirilir ki, genellikle Akdeniz Havzası ile ilişkilendirilmesine rağmen, kesin bir menşe bölgesi tanımlanmamıştır. Zakkum Arapça kökenli bir kelimedir, bitkinin Türkçe adı Ağarcık'tır.

- Çok yıllık
- Endemik Değil
- Akdeniz İklimi

MUZ

Musa Banana



Musa Banana, diğerk ismiyle Muz Ağacı Bitkisi Güney Doğı Asya kökenli lokal bir bitkidir. Büyük, geniş, kürek biçiminde yeşil-kahverengi yapraklara sahiptir. Bakımı kolay olan bu bitki 20°nin altına düşmeyen, bol ışık alan bir alana yerleştirilmeli ve kontrol edildiğinde toprak tamamen kurumuşsa sulanmalıdır. Sulama esnasında fazla suyun drenaj deliklerinden tamamen akmasına dikkat edilmelidir. 2 ayda 1 gübre desteğı ve kökleri sıkışmaya başladığında saksı değışimi bitkinin gelişimi için önerilir.

- Çok yıllık
- Endemik Değıl
- Akdeniz İklimi

TİLKİ KUYRUĞU

Aparagus Densiflorus

Foxtail



Ceratophyllum demersum , yaygın olarak boynuzotu (Anthocerotophyta ile akraba olmayan ortak bir isim), sert boynuzotu , su rakunu veya su rakunu kuyruğu olarak bilinir , Ceratophyllum cinsindeki çiçekli bir bitki türüdür. Antarktika hariç tüm kıtalara özgü, kozmopolit bir dağılıma sahip, su altında kalan, serbestçe yüzen bir su bitkisidir. Yeni Zelanda'da getirilen zararlı bir ottur. Aynı zamanda popüler bir akvaryum bitkisidir. Kapalı tohumlu bitkilerin evrimini incelemek için genomu dizilenmiştir.

- Çok yıllık
- Endemik Değil
- Akdeniz İklimi

OYA AĞACI

Lagerstromia Indica



Oya ağacı (*Lagerstromia indica*), kınagiller (*Lythraceae*) familyasından Çin ve Japonya'da doğal olarak yetişen bir süs bitkisi türü.

Boyu yaklaşık 6 metre, çapı 3 yaklaşık 3 metre kadar olabilen ve küçük yuvarlak bir tepesi olan bir süs bitkisidir. Gövde kabuğu ince düzgün, sürgünleri açık pembe, bej renklidir. 4 köşeli ve tüysüz, kısa saplı yaprakları oval uçları kütçe ve 2–7 cm uzunluğunda, üst yüzü parlak-yeşil alt yüzündeki damarlar ise tüylüdür. Çiçek kurulu 4–20 cm büyüklükte, çiçekleri genellikle gül pembe renklidir. Meyveleri nohut büyüklüğünde kapsüller şeklinde olur.

- Çok yıllık
- Endemik Değil
- Akdeniz, İç anadolu

CENNET BAMBUSU

Nandina Domestica



Nandina domestica yaygın olarak nandina ,cennet bambusu veya kutsal bambu olarak bilinir, Berberidaceae familyasından Himalayalar'dan Japonya'ya kadar doğu Asya'ya özgü bir çiçekli bitki türüdür . Monotipik Nandina cinsinintek üyesidir . Serin aylarda parlak kırmızı sonbahar yaprakları ve ilkbaharda çekici yeni yapraklar gösteren bir dizi çeşidiyle bahçelerde süs bitkisi olarak yaygın olarak yetiştirilir. Popüler bir süs çalısı olmasına rağmen, meyveleri kuşlar için zehirlidir, özellikle diğer besin kaynaklarının kıtlığı kış sonuna doğru.

Latince cins adı Nandina , Japonca nanten (南天) adından türetilmiştir .Türe özgü epitet domestica , 'evcilleştirilmiş' veya 'ev halkından' anlamına gelir.

- Çok yıllık
- Endemik Değil
- Asya, Akdeniz

MAVİ YUKKA

Yucca rostrata



Yucca rostrata , gagalı yucca olarak da bilinir ve Yucca cinsine ait ağaç benzeri bir bitkidir . Bu tür, Teksas'a ve Meksika'nın Chihuahua ve Coahuila bölgelerine özgüdür . Bu Yucca türü, genellikle Bw iklimleri (çöl) ve Bs iklimleri (bozkır veya yarı kurak) olmak üzere, yıllık yağışı az olan kurak bölgelerde görülür.

Yucca rostrata, tepesinde yapraklardan oluşan bir taç bulunan, 4,5 metreye kadar uzayan bir gövdeye sahiptir. Yapraklar ince, sert, 60 cm'ye kadar uzunluğa sahip, ancak nadiren 15 mm'den geniş, uçta sivri bir noktaya doğru incelir. Çiçek salkımı , beyaz çiçeklerle 100 cm boyunda büyük bir salkımdır.

- Çok yıllık
- Endemik Değil
- Amerika

GOLD TAFLAN

Euonymus Japonica Var Aurea



Euonymus japonicus, 3-12 cm (1,2-4,7 inç) uzunluğunda, daha genellikle 6-10 cm (2,4-3,9 inç) uzunluğunda, yaprakların sonuna doğru ince tırtıklı kenarları olan, 3 m (10 ft) boyunda büyüyen, yaprak dökmeyen bir çalı veya küçük bir ağaçtır. Çiçekler göze çarpmayan, yeşilimsi beyaz, 5-6 mm (0,2 inç) çapındadır. Meyve kapsülü kahverengi veya sarı ila kırmızı-kahverengidir. Tohumların turuncu-kırmızı bir kabuğu vardır.

Euonymus japonicus, özellikle yetiştirme açısından *Euonymus fortunei*'ye çok benzer. Vahşi doğada, *E. japonicus*'un ereksiyon alışkanlığı vardır, oysa *E. fortunei* tırmanıyor veya yükseliyor.

- Çok yıllık
- Endemik Değil
- Japonya, Çin

ŞİMŞİR

Buxus sempervirens



Şimşir, şimşirgiller (Buxaceae) familyasının Buxus cinsinden çalılara verilen addır.

Genel olarak çalı, nadiren ağaççık formunda herdemyeşil bitkilerdir. Sürgünleri dört köşelidir. Yaprakları derimsi, tam kenarlı ve tüsüzdür. Gölgeye dayanıklı, yavaş büyüyen nemli besin maddelerince zengin toprakları tercih eder. Çok nadir de olsa ağaç formunda olabilir ve kuşüzümüne benzer meyveler verir. Sudan yoğun olan ender bitkilerden biridir. Doğal görünümü ve dayanıklılığından dolayı tahta kaşık oymacılığında tercih edilirler.

- Çok yıllık
- Endemik Değil
- Karadeniz, Akdeniz

PAŞA KILICI

Sansevieria trifasciata



Yoğun dallar oluşturan, bazen yer üstünde, bazen de yer altında bulunan sürünen köksapı aracılığıyla yayılan , her dem yeşil, çok yıllık bir bitkidir . Sert yaprakları, dipteki bir rozetten dikey olarak büyür . Olgun yaprakları, açık gri-yeşil çapraz bantlı koyu yeşil renktedir ve genellikle 70-90 santimetre (2,3-3,0 ft) uzunluğunda ve 5-6 santimetre (2,0-2,4 inç) genişliğindedir, ancak optimum koşullarda 2 m'nin (6 ft) üzerine çıkabilir.

Belirli sıfat olan trifasciata " üç demetli" anlamına gelir.

Bitki, kuraklığa dayanıklı olmasını sağlayan crassulacean asit metabolizması sürecini kullanarak oksijen ve karbondioksit alışverişinde bulunur . Bitkinin yapraklarındaki stoma adı verilen ve gaz alışverişi için kullanılan mikroskobik gözenekler, sıcak güneşte suyun buharlaşarak kaçmasını önlemek için yalnızca geceleri açılır .

- Çok yıllık
- Endemik Değil

DEVE TABANI

Philodendron xanadu



Thaumatophyllum xanadu, Araceae familyasına ve *Thaumatophyllum* cinsine. Eskiden *Philodendron* cinsinin *Meconostigma* alt cinsi. Bu bitki Brezilya'ya özgüdür, ancak tropikal, subtropikal ve ılıman iklimlerde peyzaj bitkisi olarak yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Thaumatophyllum xanadu , 1,5 metreye (5 fit) kadar boy ve 1,5 metre (5 fit) kadar genişlikte yoğun kümeler oluşturan çok yıllık bir bitkidir. 40 cm (16 inç) uzunluğa ve 30 cm (12 inç) genişliğe kadar parlak yeşil, derin parçalı, loblu yapraklara sahiptir. Çiçeklerinin koyu kırmızı spatları vardır. Bazen hava kökleri üretebilir.

- Çok yıllık
- Endemik Değil
- Güney Amerika, Akdeniz

KABUKLU ZENCEFİL

Alpinia zerumbet



Alpinia zerumbet , diğ er adlarının yanı sıra kabuklu zencefil olarak da bilinir, Doğıu Asya'ya  zg   ok yıllık bir zencefil t r d r . Bitkiler 2,5 ila 3 metreye (8 ila 10 fit) kadar b y yebilir ve renkli huni Őeklinde    ekler taŐır. S s bitkisi olarak yetiŐtirilir ve yaprakları mutfak ve geleneksel tıpta kullanılır.

Doğıu Asya'ya  zg  olan Alpinia zerumbet , tropikal iklimlerde 2,4 ila 3,0 m (8 ila 10 ft) boyunda dik k meler halinde b y yen rizomat z, her dem yeŐil tropikal  ok yıllık bir bitkidir. Huni bi imli    ekler taŐır.    eklerin, kırmızı benekli ve  izgili sarı labella ile beyaz veya pembe periantları vardır.

-  ok yıllık
- Endemik Değıl
- Asya

BEGONVİL

Bougainvillea



Begonvil, mor, beyaz, pembe ve kırmızı renkte çiçekleri olan, tırmanıcı özellikte ve ağaçsı bir bitkidir. Güneşi sever. Hastalık ve böcek barındırmaması önemli bir özelliğidir.

Adını, kendisini 1768 yılında Brezilya'da keşfeden ve Avrupa'da tanınmasını sağlayan Fransız amiral Louis Antoine de Bougainville'den almıştır. Gelin Duvağı ve Rodos Sarmaşığı olarak da bilinir.

- Çok yıllık
- Endemik Değil
- Akdeniz

KRALİÇE PALMİYE

Syagrus romanzoffiana



Syagrus Romanzoffiana (Kraliçe Palmiye - Arecastrum), Ana vatanı Güney Amerika, Brezilyadır. Palmiyegiller familyasından popüler bir peyzaj bitkisidir. Ilıman ve tropikal iklimlerde yetişmektedir. boyları maximum 15 metreye kadar çıkmaktadır. -10 dereceye kadar soğukluğa dayanıklıdır ve lifli bir gövde yapısına sahiptir. Yapraklarını dökmez ve yeşil renklidir.

Türkiye'de başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere Ege, Marmara, Karadeniz sahil şeridi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin iklim şartlarına uyumluluk sağlamaktadır. İç bölgelerde iklim şartlarından dolayı yaşama imkanları çok azdır.

- Çok yıllık
- Endemik Değil
- Güney Amerika, Akdeniz